

Лекция 13. Вязкопластические среды: численное решение с помощью алгоритма Узавы.

Из теоремы Мазура следует

Предложение 1. Пусть X — банахово пространство, $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x$. Тогда существует последовательность конечных выпуклых комбинаций векторов x_n , сходящаяся к x по норме.

Пусть (X, τ) — топологическое пространство. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ называется секвенциально полунепрерывной снизу, если для любой последовательности $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\tau} x$ выполнено $f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$.

Если (X, ρ) — метрическое пространство, то полунепрерывность снизу эквивалентна секвенциальной полунепрерывности снизу. Слабая топология на бесконечномерном банаховом пространстве не метризуема, однако из предложения 1 следует

Предложение 2. Если X — банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ выпукла и полунепрерывна снизу, то она секвенциально полунепрерывна снизу относительно слабой топологии.

Множество $M \subset X$ называется секвенциально компактным, если из любой последовательности $\{x_n\} \subset M$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к точке из M . Для метрических пространств компактность эквивалентна секвенциальной компактности. Оказывается, для слабой топологии выполнено то же самое: множество слабо компактно тогда и только тогда, когда оно секвенциально слабо компактно (**теорема Эберлейна – Шмульяна**).

1 Существование седловой точки.

Пусть X, Y — банаховы пространства, $L \subset X, M \subset Y, \mathcal{L} : L \times M \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Точка $(\bar{x}, \bar{y}) \in L \times M$ называется седловой точкой функции \mathcal{L} , если для любых $x \in L, y \in M$ выполнено $\mathcal{L}(\bar{x}, y) \leq \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{y}) \leq \mathcal{L}(x, \bar{y})$.

Мы докажем теорему о существовании седловой точки в следующей формулировке:

Теорема 1.1. Пусть X, Y — рефлексивные банаховы пространства, $M \subset Y$ выпукло, замкнуто и ограничено, $\mathcal{L} : X \times M \rightarrow \mathbb{R}$, для любых $x \in X, y \in M$ функции $\mathcal{L}(\cdot, y) : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $-\mathcal{L}(x, \cdot) : M \rightarrow \mathbb{R}$ являются выпуклыми и полунепрерывными снизу и

$$\mathcal{L}(x, y) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty \text{ равномерно по } y \in M. \quad (1.1)$$

Пусть, кроме того, для любого $y \in M$ функция $\mathcal{L}(\cdot, y)$ строго выпукла.¹ Тогда \mathcal{L} имеет седловую точку.

Доказательство. Так как функция $\mathcal{L}(\cdot, y)$ выпукла, коэрцитивна и полунепрерывна снизу, то она имеет точку минимума e_y . Кроме того, из строгой выпуклости следует, что e_y единственна для любого $y \in M$. Положим $f(y) = \mathcal{L}(e_y, y)$. Тогда $-f(y) =$

¹От этого условия можно избавиться (см. [2]), но для приложения к задаче о движении среды Бингама достаточно такой формулировки.

$\max_{x \in X} (-\mathcal{L}(x, y))$ является выпуклой и полунепрерывной снизу на M (поскольку задается как максимум семейства функций с такими свойствами). Значит, f достигает максимума в некоторой точке \bar{y} .

Положим $\bar{x} = e_{\bar{y}}$. Мы покажем, что (\bar{x}, \bar{y}) является седловой точкой. Пусть $y \in M$, $\lambda_n \in (0, 1)$, $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, $y_n = (1 - \lambda_n)\bar{y} + \lambda_n y$, $x_n = e_{y_n}$. Тогда из определения \bar{y} , $e_{\bar{y}}$ и вогнутости \mathcal{L} по второму аргументу получаем

$$\begin{aligned} f(\bar{y}) &\geq f(y_n) = \mathcal{L}(x_n, (1 - \lambda_n)\bar{y} + \lambda_n y) \geq \\ &\geq (1 - \lambda_n)\mathcal{L}(x_n, \bar{y}) + \lambda_n\mathcal{L}(x_n, y) \geq (1 - \lambda_n)f(\bar{y}) + \lambda_n\mathcal{L}(x_n, y). \end{aligned}$$

Значит,

$$f(\bar{y}) \geq \mathcal{L}(x_n, y). \quad (1.2)$$

Из (1.1) следует, что $\{x_n\}$ ограничена, поэтому содержит слабо сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности, $x_n \xrightarrow{w} \hat{x}$.

Докажем, что $\hat{x} = \bar{x}$. Для этого достаточно проверить, что $\mathcal{L}(\hat{x}, \bar{y}) \leq \mathcal{L}(x, \bar{y})$ для любого $x \in X$. В силу единственности $e_{\bar{y}}$, $\hat{x} = \bar{x}$.

Пусть $x \in X$. Так как $\mathcal{L}(\cdot, \bar{y})$ полунепрерывна снизу, то

$$\mathcal{L}(\hat{x}, \bar{y}) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}(x_n, \bar{y}).$$

Так как $\mathcal{L}(x_n, \cdot)$ вогнута, то

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_n, \bar{y}) &\leq \mathcal{L}(x_n, \bar{y}) + \mathcal{L}(x_n, y_n) - (1 - \lambda_n)\mathcal{L}(x_n, \bar{y}) - \lambda_n\mathcal{L}(x_n, y) \leq \\ &\leq \lambda_n\mathcal{L}(x_n, \bar{y}) - \lambda_n\mathcal{L}(x_n, y) + \mathcal{L}(x, y_n) \leq \lambda_n\mathcal{L}(x_n, \bar{y}) - \lambda_n\mathcal{L}(e_y, y) + \mathcal{L}(x, y_n), \end{aligned}$$

так что

$$\mathcal{L}(x_n, \bar{y}) \leq -\frac{\lambda_n}{1 - \lambda_n}\mathcal{L}(e_y, y) + \frac{1}{1 - \lambda_n}\mathcal{L}(x, y_n).$$

Так как $-\mathcal{L}$ полунепрерывна снизу по второму аргументу, то отсюда и из предложения 2 получаем

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}(x_n, \bar{y}) \leq \mathcal{L}(x, \bar{y}).$$

Следовательно, $\mathcal{L}(\hat{x}, \bar{y}) \leq \mathcal{L}(x, \bar{y})$.

Проверим, что $\mathcal{L}(\bar{x}, \bar{y}) \leq \mathcal{L}(\bar{x}, y)$. В самом деле, в силу (1.2) и секвенциальной полунепрерывности снизу $\mathcal{L}(\cdot, y)$ относительно слабой топологии

$$\mathcal{L}(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{y}) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}(x_n, y) \geq \mathcal{L}(\bar{x}, y).$$

□

2 Алгоритм Узавы.

Пусть H — гильбертово пространство, $a(u, v)$ — билинейная непрерывная форма, на H , удовлетворяющая неравенству

$$a(v, v) \geq \alpha \langle v, v \rangle, \quad \text{где } \alpha > 0. \quad (2.1)$$

Пусть $v \mapsto (f, v)$ — линейный непрерывный функционал,

$$J_0(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - (f, v),$$

L — гильбертово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$, $\Phi : H \rightarrow L$, $\Lambda \subset L$ — выпуклое замкнутое множество. Предположим, что для любого $q \in L$ выполнено условие:

$$v \mapsto \langle q, \Phi(v) \rangle_L \text{ выпукла и полунепрерывна снизу на } H. \quad (2.2)$$

Рассматривается задача

$$\inf_{v \in H} \left[J_0(v) + \sup_{q \in \Lambda} \langle q, \Phi(v) \rangle_L \right]. \quad (2.3)$$

Пример. $H = \dot{W}_2^1(\Omega)$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченное множество, $a(v, v) = \|v\|_H^2$, $f \in L_r(\Omega)$, $r > 1$, $(f, v) = \int_{\Omega} f v \, dx$ (из теоремы вложения следует, что этот функционал непрерывен), $L = L_2(\Omega, \mathbb{R}^2)$, $\Phi v = \nabla v$,

$$\Lambda = \{q \in L : |q(x)| \leq \tau \text{ п.в. в } \Omega\}.$$

Тогда

$$\sup_{q \in \Lambda} \langle q, \Phi(v) \rangle_L = \tau \int_{\Omega} |\nabla v| \, dx.$$

Введем функцию Лагранжа

$$\mathcal{L}(v, q) = J_0(v) + \langle q, \Phi(v) \rangle_L.$$

Предположим, что выполнены следующие условия:

1. функция \mathcal{L} имеет седловую точку, то есть существуют такие $u \in H$, $p \in L$ такие, что

$$\mathcal{L}(u, q) \leq \mathcal{L}(u, p) \leq \mathcal{L}(v, p), \quad v \in H, \quad q \in \Lambda;$$

2. функция Φ удовлетворяет условию Липшица с константой C_1 .

В частности, если Λ ограничено, то седловая точка существует по теореме 1.1.

Пусть P_{Λ} — оператор метрического проектирования на множество Λ (каждой точке из X сопоставляется ближайшая к ней из Λ). Так как пространство L гильбертово, а Λ выпукло и замкнуто, то элемент наилучшего приближения существует и единствен, и, кроме того, P_{Λ} липшицев с константой 1 (**упражнение**).

Пусть $(u, p) \in H \times L$ — седловая точка. Тогда

$$J_0(u) + \langle p, \Phi(u) \rangle_L \leq J_0(v) + \langle p, \Phi(v) \rangle_L, \quad v \in H, \quad (2.4)$$

$$\langle q - p, \Phi(u) \rangle \leq 0, \quad q \in \Lambda. \quad (2.5)$$

Последнее условие равносильно равенству

$$p = P_{\Lambda}(p + \rho \Phi(u)) \quad \text{для любого } \rho > 0. \quad (2.6)$$

В самом деле, в случае $\Phi(u) = 0$ оба условия выполнены. Рассмотрим случай $\Phi(u) \neq 0$. Пусть выполнено (2.5), то есть множество Λ содержится в полупространстве

$$E = \{q \in L : \langle q, \Phi(u) \rangle \leq \langle p, \Phi(u) \rangle\}.$$

Вектор $\Phi(u)$ ортогонален гиперплоскости

$$S := \{q \in L : \langle q, \Phi(u) \rangle = \langle p, \Phi(u) \rangle\}.$$

Значит, для любого $\rho > 0$ точка p является ближайшей к $p + \rho\Phi(u)$ в полупространстве E . Тем более, $p = P_\Lambda(p + \rho\Phi(u))$.

Обратно, пусть выполнено (2.6). Тогда внутренность шара B с центром в точке $p + \Phi(u)$ и радиусом $\|\Phi(u)\|_L$ не пересекается с Λ , поэтому B и Λ можно разделить гиперплоскостью. Она является опорной к B в точке p и, следовательно, совпадает с S . При этом, $\langle p + \Phi(u), \Phi(u) \rangle > \langle p, \Phi(u) \rangle$, откуда $\Lambda \subset E$.

На основании этого предлагается следующий алгоритм приближенного нахождения седловой точки (*алгоритм Узавы*).² Начинаем с произвольной точки $p^0 \in \Lambda$, по ней находим u^0 , затем находим p^1 , и т.д. Индукционный переход записывается следующим образом:

1. если найден элемент $p^n \in \Lambda$, находим $u^n \in H$ как точку минимума функционала $J_0(v) + \langle p^n, \Phi(v) \rangle_L$ (см. (2.4)).
2. полагаем $p^{n+1} = P_\Lambda(p^n + \rho_n \Phi(u^n))$ (см. (2.6)), где $\rho_n > 0$ — параметр, который позже будет подбираться.

Теорема 2.1. (о сходимости алгоритма Узавы). *Существуют такие $0 < \alpha_0 < \alpha_1 < \infty$, что при $\rho_n \in (\alpha_0, \alpha_1)$ выполнено*

$$u^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u \text{ по норме пространства } H. \quad (2.7)$$

Доказательство. Условие (2.4) эквивалентно

$$J'_0(u)[v - u] + \langle p, \Phi(v) - \Phi(u) \rangle_L \geq 0, \quad v \in H, \quad (2.8)$$

а условие на u^n —

$$J'_0(u^n)[v - u^n] + \langle p^n, \Phi(v) - \Phi(u^n) \rangle_L \geq 0, \quad v \in H. \quad (2.9)$$

В самом деле, по определению субдифференциала и теореме Моро – Рокафеллара (2.4) эквивалентно условию $0 \in J'_0(u) + \partial \langle p, \Phi(\cdot) \rangle(u)$, т.е. $-J'_0(u) \in \partial \langle p, \Phi(\cdot) \rangle(u)$. Снова по определению субдифференциала, последнее равносильно (2.8). Эквивалентность (2.9) и условия на u^n доказывается аналогично.

Подставляем $v = u^n$ в (2.8), $v = u$ в (2.9), складываем эти неравенства и получаем

$$(J'_0(u^n) - J'_0(u))[u^n - u] + \langle p^n - p, \Phi(u^n) - \Phi(u) \rangle_L \leq 0.$$

Так как $a(u, v)$ билинейна, то отсюда следует, что

$$a(u^n - u, u^n - u) + \langle p^n - p, \Phi(u^n) - \Phi(u) \rangle_L \leq 0. \quad (2.10)$$

Обозначим $r^n = p^n - p$. Из (2.6) и определения p^{n+1} следует, что

$$r^{n+1} = P_\Lambda(p^n + \rho_n \Phi(u^n)) - P_\Lambda(p + \rho_n \Phi(u)).$$

Поскольку отображение P_Λ липшицево с константой 1, получаем

$$\|r^{n+1}\|_L^2 \leq \|r^n + \rho_n(\Phi(u^n) - \Phi(u))\|_L^2 = \|r^n\|_L^2 + 2\rho_n \langle r^n, \Phi(u^n) - \Phi(u) \rangle_L + \rho_n^2 \|\Phi(u^n) - \Phi(u)\|_L^2.$$

²См. [1].

Воспользуемся неравенствами (2.10), (2.1) и тем, что Φ липшицево с константой C_1 , и получим

$$\begin{aligned} \|r^{n+1}\|_L^2 &\leq \|r^n\|_L^2 - 2\rho_n a(u^n - u, u^n - u) + C_1^2 \rho_n^2 \|u^n - u\|_L^2 \leq \\ &\leq \|r^n\|_L^2 - (2\alpha\rho_n - C_1^2 \rho_n^2) \|u^n - u\|_L^2. \end{aligned}$$

Выберем $\alpha_1 > \alpha_0 > 0$ так, чтобы $2\alpha\rho_n - C_1^2 \rho_n^2 \geq \beta > 0$. Тогда

$$\|r^{n+1}\|_L^2 \leq \|r^n\|_L^2 - \beta \|u^n - u\|_L^2.$$

Значит, последовательность $\{\|r^n\|_L\}$ убывает и поэтому сходится. Отсюда

$$\|u^n - u\|_L^2 \leq \beta^{-1} (\|r^n\|_L^2 - \|r^{n+1}\|_L^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер, *Численное исследование вариационных неравенств*. М.: Мир, 1979.
- [2] И. Экланд, Р. Темам, *Выпуклый анализ и вариационные проблемы*. М.: Мир, 1979.